

**Тесты по психиатрии для ОМХ 3-курса**  
**Всего: 305 штук. Одноответные – 95**  
**Двухответные – 40**  
**Трехответные - 170**

**Одноответные - 95 штук**

# Больной постоянно чувствует, что у него под кожей ползают мелкие насекомые. Описанное расстройство называется:

- сенестопатии
- + тактильные галлюцинации
- психосенсорные расстройства
- висцеральные галлюцинации
- псевдогаллюцинации

# Больной чувствует, что внутри его тела что-то «лопается», «отслаивается», «переворачивается». Описанное расстройство называется:

- парейдолии
- парестезии
- психосенсорные расстройства
- + сенестопатии
- висцеральные галлюцинации

# Пациент в узорах на ковре видит различные фигуры людей, животных. Описанное расстройство называется:

- + парейдолические иллюзии
- дереализация
- психосенсорные расстройства
- гиперэстезия
- парестезии

# Больной жалуется, что окружающие звуки воспринимались как бы через толстое стекло. Освещение в палате воспринималось тусклым. Описанное расстройство называется:

- парестезия
- + гипостезия
- сенестопатия
- парейдолии
- псевдогаллюцинации

# Больной жалуется, что обычный свет ослепляет, звуки оглушают, щелчок замка воспринимается как выстрел. Все раздражает. Описанное расстройство называется:

- + гиперэстезия
- сенестопатия
- психосенсорные расстройства
- парейдолии
- псевдогаллюцинации

# Эпизодически возникающее мнимое восприятие неопределенных шумов (щелчков, свиста, шороха и т. п.) называется:

- псевдогаллюцинации

- + акоазмы
- метаморфозии
- парейдолии
- гиперестезии

# Эпизодически возникающее мнимое восприятие вспышек света имеет название:

- псевдогаллюцинации
- микропсии
- парейдолии
- + фотопсии
- метаморфозии

# Тактильные ощущения, возникающие при звуках музыки, — это:

- парестезии
- сенестопатии
- псевдогаллюцинации
- + рефлекторные галлюцинации
- парейдолии

# Погружение в мир собственных переживаний с утратой интересов к окружающему называется:

- + аутизмом
- кататонией
- меланхолией
- мутизмом
- паранойей

# 35-летняя мать очень переживает и тревожится из-за невозможности отделаться от произвольно возникающего желания ударить своего ребенка острым предметом. Такое расстройство называется:

- бредовые идеи
- идеаторный автоматизм
- компульсии
- + обсессии
- сверхценные идеи

# Больной заболел после оперативного вмешательства по поводу гнойного гайморита. Пример речи больного: «Запечатлено... слышно сколько сердце бьется... изображение... предмет другой... барометр... посуда для воды... тут кнопки...» Это расстройство мышления называется:

- атактическое
- аутистическое
- + бессвязное
- обстоятельное
- резонерское

# Учащийся колледжа в течение 3 лет предъявляет многочисленные жалобы на неприятные ощущения и нарушения функции со стороны желудочно-кишечного тракта без какой-либо органической причины, не вполне доверяя результатам предыдущих обследований и добиваясь повторных консультаций специалистов. Это:

- + ипохондрический синдром
- истерический (конверсионный) синдром

- обсессивный синдром
- психоорганический синдром
- синдром деперсонализации

# Наиболее точное определение явления ПСИХИЧЕСКОГО АВТОМАТИЗМА

- + отчуждение больным своих чувств, мыслей, движений
- подсознательное повторение больным мимики врача
- ложные суждения больного, не поддающиеся коррекции
- подсознательно совершаемые повторные движения
- импульсивные, немотивированные поступки больных

# Проявлениями синдрома Кандинского-Клерамбо являются все перечисленные ниже симптомы, КРОМЕ:

- + персеверации
- псевдогаллюцинации
- бред воздействия
- психический автоматизм
- симптом открытости

# Наиболее точное определение понятия ИПОХОНДРИЯ:

- беспричинные боли в подреберье
- чувство усталости, подавленности, разбитости, тоски
- чувство апатии, безразличия, сопровождающееся безделием и равнодушием
- + опасения или убежденность больного в наличии у него соматического заболевания, не существующего в действительности
- чувство радости

# Сверхценные идеи характеризуются:

- бесцельным рассуждательством
- возникновением на патологической почве
- критическим отношением
- + переоценкой реальных фактов
- ускорением темпа мышления

# Охватывает четко ограниченный промежуток времени:

- + ретроградная амнезия
- прогрессирующая амнезия
- фиксационная амнезия
- все указанные виды амнезий
- ни один из названных симптомов

# Постоянные затруднения, возникающие при попытке запомнить какую-либо информацию или воспроизвести сохраненные в памяти события:

- + гипомнезия
- амнезия
- парамнезии
- все названные расстройства
- ни одно из указанных расстройств

# Предъявление в качестве воспоминаний вымышленных событий:

- криптомнезии
- псевдореминисценции

- + конфабуляции
- все названные расстройства
- ни одно из указанных расстройств

# Предъявление в качестве воспоминаний событий, действительно происходивших, но в другое время:

- криптомнезии
- конфабуляции
- + псевдореминисценции
- все названные расстройства
- ни одно из указанных расстройств

# Фиксационная амнезия свидетельствует о том, что поражены:

- лобные доли
- + височные доли и лимбическая система
- теменные доли
- затылочные доли
- ретикулярная формация и locus coeruleus

# Закон Рибо характерен для:

- антероградной амнезии
- + прогрессирующей амнезии
- фиксационной амнезии
- рекуррентной амнезии
- перфорационной амнезии

# Приводит к дезориентации в месте и времени:

- ретроградная амнезия
- конфабуляции
- + фиксационная амнезия
- все указанные виды амнезий
- ни один из названных симптомов

# Как правило, приводит к дезориентации в собственной личности:

- ретроградная амнезия
- прогрессирующая амнезия
- фиксационная амнезия
- все указанные виды амнезий
- + ни один из названных симптомов

# Для депрессивного синдрома наиболее характерны следующие расстройства сна:

- кошмарные сновидения
- сонливость в дневное время
- затруднено пробуждение по утрам
- раздражительность и поверхностный сон
- + раннее пробуждение и отсутствие чувства сна

# Реактивное состояние – это

- быстрое разрушительное действие при помрачении сознания
- + расстройства вызванные психотравмирующей ситуацией стрессом
- реакция на прекращение лечения
- психические изменения во время перелёта на реактивном самолёте

-возникает в результате длительного воздействия психогенного фактора

# При неврастении ведущее место в клинической картине заболевания занимает

- +астенический синдром
- гебефренический синдром
- синдром Кандинского–Клерамбо
- фобии
- псевдогаллюцинация

#Возбуждение характеризующееся гримасничанием кривлянием немотивированным смехом называется

- маниакальным
- +гебефреническим
- кататоническим
- эпилептическим
- параноидным

#Возбуждение характеризующееся повышенным настроением и самочувствием выразительной мимикой и жестами ускоренной речью усиленной деятельностью называется

- +маниакальным
- гебефреническим
- кататоническим
- эпилептическим
- депрессивным

#Мутизм—это

- расстройство речи+характеризующееся неправильным произношением отдельных звуков
- обеднение речи малый запас слов
- смазанная запинаящаяся речь
- +состояние когда пациент не отвечает на вопросы и даже знаками не даёт понять что он согласен вступить в контакт с окружающими
- паралогическим мышлением

#Повторение пациентом слов и фраз окружающих называется

- дислалия
- + эхολалия
- дизартрия
- заикание
- персеверация

#Ступор—это

- расстройство мышления
- +двигательное расстройство
- расстройство памяти
- расстройство ощущений
- нарушение сознания

#Немотивированное влечение к воровству называется

- +клептоманией
- пироманией

- дипсоманией
- мифоманией
- нозофобия

#Утрата чувства голода отсутствие аппетита характерны для

- булимии
- полидипсии
- +анорексии
- парорексии
- полиофия

#При серийных эпилептических припадках пациенту необходимо ввести

- аминазин
- амитриптилин
- стелазин
- +реланиум
- натрий хлор

#Резонёрство характеризуется

- +склонностью к пустым рассуждениям
- отсутствием связи между отдельными мыслями или даже словами
- полной хаотичностью+бессмысленностью мышления
- отсутствием в мышлении логической связи
- не вступает в контакт

#Врожденное слабоумие называется

- деменцией
- аменцией
- +олигофрения
- эпилепсией
- делирий

#Приобретенное слабоумие называется

- +деменцией
- аменцией
- олигофренией
- эпилепсией
- шизофрения

#К расстройствам эмоций относятся

- деменция, умственная отсталость
- астения, нарушение сна
- амнезия, конфабуляции
- +эйфория, аффективные расстройства
- дисфория, аменция

#К расстройствам восприятия+ когда человек вследствие нарушений психической деятельности видит слышит ощущает то что в реальной действительности не существует относятся

- +галлюцинации
- иллюзии
- сенестопатии

- синестезии
- аллестезия

#К расстройствам восприятия при которых реальные явления или предметы воспринимаются человеком в измененном ошибочном виде относятся

- галлюцинации
- +иллюзии
- сенестопатии
- синестезии
- резонерство

#К расстройствам восприятия при которых возникают патологические ощущения в виде возникающего в различных частях тела или внутренних органах неприятного чувства покалывания давления жжения стягивания не связанного с какой-либо соматической патологией относятся

- галлюцинации
- иллюзии
- сенестопатии
- синестезии
- бред

#К расстройствам восприятия при которых внешний раздражитель адресованный к одному анализатору вызывает одновременно ответ с какого, то другого или нескольких анализаторов относятся

- галлюцинации
- иллюзии
- сенестопатии
- +синестезии
- агнозия

#Основное правило ухода за депрессивным больным

- режим несценения
- постельный режим
- +усиленное наблюдение
- проведение медико-педагогических мероприятий
- диета

# При алкогольном психозе характерен вариант помрачения сознания

- онейроид
- +делирий
- амнезия
- кома
- сопор

#Отличие иллюзий от галлюцинаций заключается в

- + наличии или отсутствии внешнего раздражителя
- содержания переживаний
- степени нарушения сознания
- степени нарушения мышления
- грубое нарушение памяти

#Для паранойяльного бреда характерно

- наличие истинных галлюцинаций
- наличие псевдогаллюцинаций
- +отсутствие галлюцинаций
- наличие иллюзий
- обсессии

#К навязчивым движениям относятся

- припадки
- + тики
- автоматизмы при синдромах Кандинского–Клерамбо
- псевдогаллюцинации
- истинные галлюцинации

#Проявлением мании является

- +повышенное настроение
- сниженное настроение
- суицидальные мысли
- апатия
- дисфория

#Дисфорию можно определить как

- повышенное настроение
- расстройство речи
- +злобно–тоскливое настроение
- отсутствие эмоциональных реакций
- отсутствие воли

# Апатия–это

- снижение настроения
- повышение настроения
- злобно–тоскливое настроение
- + отсутствие эмоциональных реакций на внешние раздражители
- нарушения ощущения

#Расстройства памяти наиболее характерны для

- +органических заболеваний головного мозга
- шизофрении
- психопатии
- кататонического синдрома
- невроз

#Фиксационная амнезия может быть определена как

- амнезия следующих за черепно–мозговой травмой событий
- + незапоминание текущих событий
- патологическое фантазирование
- амнезия событий произошедших много лет назад
- амнезия на события предидущие ЧМТ

#Легкая степень умственной отсталости

- +дебильность
- имбецильность
- идиотия

- ступор
- деменция

#Наиболее тяжелая степень интеллектуальной недостаточности

- дебильность
- имбецильность
- + идиотия
- ступор
- деменция

#Для делирия характерны

- +истинные зрительные галлюцинации
- зрительные псевдогаллюцинации
- конфабуляции
- псевдореминисценции
- эхомнезия

#Онейроид можно определить как

- разновидность делирия
- +сновидное помрачение сознания
- вариант синдрома Корсакова
- вариант синдрома Кандинского–Клерамбо
- ипохондрический бред

#Необдуманное прерывание приступа при эпилепсии может привести к

- +эпилептическому статусу
- маниакальному состоянию
- кататоническому возбуждению
- кататоническому ступору
- пюэрилизм

#Эпилептический статус опасен тем что пациент

- +может погибнуть
- опасен для окружающих
- склонен к суициду
- склонен к побегу
- склонен к ступору

#Страдающий эпилепсией склонен к

- кататоническим состояниям
- +дисфориям
- маниакальным состояниям
- депрессивным состояниям
- полное выздоровление

# При истерическом припадке в отличие от эпилептического

- + полностью сохраняется сознание
- частично сохраняется ясность сознания
- сознание полностью нарушено
- отмечаются бредовые идеи
- поочередность

# Психопатия—это

- +стойкая патология характера
- хроническое прогрессирующее заболевание
- временное психическое заболевание
- помрачение сознания
- нарушение восприятия

#Демонстративность и суицидальный шантаж характерны для

- +истероидной психопатии
- эпилептоидной психопатии
- гипертимной психопатии
- неврастении
- шизоидная психопатия

#К основным видам алкогольных психозов относится

- псевдогаллюциноз
- маниакальный психоз
- +делирий
- онейроид
- кома

#Режим психиатрического стационара предусматривает

- +изоляция пациента в целях терапии психопатологических проявлений
- длительную изоляцию пациента от психотравмирующей обстановки
- +психотерапию
- гирудотерапию
- уринотерапия

#Основным признаком астении является

- головная боль
- вегето—сосудистая дистония
- +утомляемость
- психический автоматизм
- амбулаторный автоматизм

# Для шизофрении характерны эмоциональные нарушения в виде

- дисфории
- +апатии
- эйфории
- аффективной возбудимости
- дисфория

#Тихая монотонная медленная речь присуща пациентам с

- кататонией
- бредом преследования
- бредом громадности
- +депрессией
- мания

#Истинные зрительные галлюцинации характерны для

- шизофрении
- +интоксикационного делирия

- инволюционной меланхолии
- кататонии
- эпилепсия

#Основанием помещения пациента в психоневрологический интернат является

- хроническое психическое заболевание с частыми обострениями
- недееспособность
- отсутствие опекуна
- невменяемость
- +психомоторное возбуждение

#Ажитированная депрессия — это:

- депрессия с адинамией и ступором
- синоним маскированной депрессии
- депрессия с раздражительностью и злобой
- +тревожное возбуждение у депрессивных больных
- сочетание признаков ярко выраженной мании и дисфории

#Симптом, являющийся наиболее важным для диагностики депрессивного синдрома:

- бессонница
- +аффект витальной тоски
- замкнутость, бездеятельность
- периферическая симпатикотония
- двигательная и мыслительная заторможенность

#Дисфорией называется:

- слезливость, благодушие
- эмоциональная неустойчивость
- сочетание мании и депрессии
- +тоскливо-злое настроение
- ничего из вышеуказанного

#Наиболее частое проявление конечных состояний при шизофрении:

- +апатия
- слабодушие
- амбивалентность
- дисфория
- эйфория

#Из материалов следствия известно, что обвиняемый, узнав о намерении жены расторгнуть брак, схватил нож и нанес ей смертельную рану. Ваше заключение:

- физиологический аффект
- патологический аффект
- бред ревности
- нет признаков психического расстройства
- +недостаточно данных для диагностики

#Слабодушие является симптомом:

- простой шизофрении
- болезни Пика
- олигофрении в степени имбецильности
- +атеросклеротической деменции

-ни одного из указанных выше заболеваний

#Дисфорией называется:

- +тоскливо-злобное настроение
- эмоциональная неустойчивость
- сочетание мании и депрессии
- слезливость, благодушие
- ничего из вышеуказанного

#Пациент застывает в одной позе, у него застывший взгляд, маскообразное лицо, руки согнуты в локтевых суставах и прижаты к туловищу, полное молчание (мутизм), негативизм. Это состояние следует расценить как:

- психогенный ступор
- +кататонический ступор
- депрессивный ступор
- апатический ступор
- аментивное помрачение сознания

#Симптом «восковой гибкости» может наблюдаться у больных с:

- алкогольным галлюцинозом
- обсессивно-фобическим неврозом
- кокаиновой интоксикацией
- алкогольным делирием
- +шизофренией

#Дромоманией называется:

- стремление к воровству и алкоголизации
- +стремление к бродяжничеству
- навязчивый страх загрязнения или заражения
- убежденность в наличии физического недостатка или уродства
- убежденность в том, что посторонние люди являются переодетыми и загримированными родственниками больного

#Признаками кататонического синдрома являются:

- ускорение мышления
- помрачение сознания
- +эхолалия и эхопраксия
- конфабуляции и псевдореминисценции
- ничего из перечисленного

#После выхода из сумеречного помрачения сознания у больного всегда выявляется:

- фиксационная амнезия
- +конградная амнезия
- ретроградная амнезия
- антероградная амнезия
- прогрессирующая амнезия

#К синдромам помрачения сознания относится:

- деменция
- психоорганический синдром

- корсаковский синдром
- синдром деперсонализации-дереализации
- +аментивный синдром

#Одним из критериев состояний нарушенного сознания является:

- +дезориентировка в окружающем
- пароксизмальность возникновения
- массивные зрительные галлюцинации
- дереализация
- деперсонализация

#Больной недоступен, лежит с закрытыми глазами, не реагирует на вопросы, при попытке сделать инъекцию начинает стонать. Такое состояние наблюдается при:

- оглушении
- +сопоре
- коме
- онейроиде
- делирии

#Внезапно начинается и так же внезапно заканчивается:

- делирий
- онейроид
- аменция
- +сумеречное состояние
- сопор

#Дезориентация в месте и времени при сохранении ориентации в собственной личности является характерной чертой:

- +делирия
- онейроида
- аменции
- сумеречного состояния
- сомноленции

#Больной лежит, он вял и сонлив, контакт затруднен, на вопросы отвечает с задержкой, односложно, правильно называет себя, продуктивной симптоматики нет. Квалифицируйте состояние:

- сумеречное состояние
- +оглушение
- онейроид
- аменция
- кома

#К формам расстройства сознания относится:

- +обнубиляция
- ажитация
- мутизм
- аутизм
- пароксизм

#Для неврозов характерно:

- нет правильного ответа

- связано с психической травмой
- вегето-висцеральные нарушения
- неглубокие эмоциональные нарушения
- +все перечисленное

#Для травматической энцефалопатии характерно:

- +все перечисленное
- эмоциональная лабильность
- снижение памяти
- снижение интеллектуальной деятельности
- нет правильного ответа

#Прогрессирующая амнезия характерна:

- шизофрения
- +старческая умственная отсталость
- эпилепсия
- пресенильный психоз
- алкоголизм

#Для эпилептического статуса характерно:

- +все перечисленное
- частые судорожные припадки
- после припадка потеря сознания
- отек мозга
- нет правильного ответа

#Половое влечение к какому-либо предмету - это...

- +фетишизм
- нарциссизм
- гомосексуализм
- педофилия
- мазохизм

#К психотическим нарушениям сознания относится:

- нет правильного ответа
- сопор
- кома
- сомналенция
- +онейроид

### Двухответные 40 штук

#Факторы способствующие возникновению иллюзий:

- + эмоциональное напряжение, предуготовленные представления
- + состояния утомления, истощения
- отставание в психическом развитии
- кататоническое возбуждение

# Истинные галлюцинации:

- + отождествляются с действительностью

- + проецируются в окружающее пространство
- всегда сочетаются с помрачением сознания
- полностью амнезируются пациентом

# Псевдогаллюцинации:

- проецируются в окружающее пространство
- + наделены чувством сделанности
- + проецируются в субъективное пространство
- являются обязательным симптомом шизофрении

# К психосенсорным расстройствам относятся:

- + аутометаморфозии
- фотопсии
- дереализация
- + дисмегалопсии

# Расстройства восприятия, возникающие пароксизмально, — это:

- психосенсорные расстройства
- иллюзии
- + *deja vu*
- + *jamais vu*

# Анестезия является симптомом:

- шизофрении
- + невроза
- + деперсонализации
- делирия

# Признаком нарушения МЫШЛЕНИЯ являются:

- + персеверации
- амбивалентность
- + резонерство
- деперсонализация

# Укажите парамнезии

- + конфабуляции
- + криптомнезии
- ретроградная амнезия
- гипомнезия

# Для депрессии характерны следующие сомато-вегетативные расстройства

- + падение массы тела
- потливость, приливы
- + запоры
- гиперсоливатация

# К осложненным формам делирия относятся:

- простой
- + профессиональный
- + мусситирующий
- абортивный

# Диагностические критерии состояний нарушенного сознания:

- + нарушение ориентировки в окружающем
- истинные галлюцинации
- + амнезия болезненных переживаний
- иллюзорные восприятия

# К основным вариантам ипохондрического синдрома относятся:

- + невротическая ипохондрия
- состояние упорной соматоформной боли
- + сенесто-ипохондрический синдром
- нервная анорексия

# В рамках депрессивного синдрома наиболее опасен следующий симптом:

- расстройство сна
- + суицидные мысли
- отсутствие аппетита
- +суицидальные действия

# Ведущими жалобами при депрессивном синдроме являются:

- колебания АД
- + снижение настроения
- приступы сердцебиения
- +устойчиво тоскливое настроение

# К нормотимикам относятся:

- пирацетам
- + карбонат лития
- пиразидол
- + карбамазепин

# Противопоказанием для психотерапии является:

- низкий уровень интеллекта
- + наличие острой психотической симптоматики
- эпилепсия
- + психоз

# Психотерапия показана больным с:

- + психосоматическими заболеваниями
- острыми психотическими расстройствами
- психозом
- + неврозом

#Эпилептическое состояние характеризуется

- +серией непрерывно следующих друг за другом больших эпилептических припадков
- +продолжительностью состояния от нескольких часов до нескольких суток
- всем перечисленным
- кратковременным нарушением памяти

#Неотложная помощь при эпилептическом состоянии включает

- +очистительную клизму
- +ректальное введение 20-30 мл 2% раствора барбитала натрия
- ничего из перечисленного

-укладывание в позу Тредленбурга

#Малые припадки характеризуются следующими признаками

- +полным выключением сознания
- +судорожным разрядом
- всем перечисленным
- длительным нарушением памяти

#Для синдрома Кандинского свойственна следующая последовательность развития его проявлений

- +симптом открытости –
- +идеаторные автоматизмы –
- сенестопатические автоматизмы - моторные автоматизмы - симптом открытости - идеаторные автоматизмы
- псевдогаллюцинации - синдром овладения - моторные автоматизмы -симптом открытости

#При параноидной шизофрении начало заболевания наиболее часто приходится

- +характеризуется проявлением негативных и позитивных симптомов
- +синдром Кандинского-Клерамбо
- на детский возраст
- на поздний возраст

#Для рекуррентной шизофрении является характерным

- +Отсутствие дефицитарных расстройств
- +Онейроидная кататония
- высокий удельный вес бредовых и галлюцинаторных расстройств
- выраженные изменения личности

#После перенесенных приступов при шубообразной шизофрении возможно

- +возникновение нажитой циклотимии
- +нарушение развития (после детских приступов)
- появление апато-абулического синдрома
- нарушение памяти

Для болезни Иценко - Кушинга характерно все перечисленное

- +сенесто-ипохондрического синдрома
- +сглаженности эмоциональных реакций
- личностных изменений в виде вязкости аффекта и ригидности
- психопатоподобных расстройств

#Виды шизофрении:

- Корсаковский психоз
- +простая
- +гебефреническая
- болезнь Альцгеймера

#Для Корсаковского синдрома характерно все:

- +снижение памяти на текущие события
- +конфабуляции
- псевдогаллюцинации

-психические автоматизмы

#Для эпилепсии характерны следующие симптомы:

- +обстоятельное мышление
- +приступы с потерей сознания
- гебефрения
- психические автоматизмы

#Выберите синдромы, в которых имеются расстройства мышления:

- +параноидный
- психоорганический
- +паранойальный
- синдром Корсакова

#Для синдрома Кандинского-Клерамбо свойственно:

- +наличие псевдогаллюцинаций
- +бред психического и физического воздействия
- иллюзорное восприятие мира
- психические автоматизмы

#В структуре синдрома Корсакова входят:

- +фиксационная амнезия
- резонёрство
- +ретро или антероградная амнезия
- прогрессирующая амнезия

# К парамнезиям относится:

- +конфабуляции
- +криптамнезии
- прогрессирующая амнезия
- фиксационная амнезия

#Галлюцинациям свойственно:

- +восприятие без реального объекта
- +отсутствие критики
- возникновение по желанию
- подмена реального объекта другим образом

#Иллюзиям присуще:

- +ложное, ошибочное восприятие
- критическое отношение
- искаженное восприятие формы и величины
- +наличие реального объекта

#Какие галлюцинации наиболее характерны для алкогольного делирия?

- +истинные зрительные
- +зоопатические
- обонятельные
- фантастические псевдогаллюцинации

#К психосенсорным нарушениям можно отнести:

- +метаморфопсии

- иллюзии
- функциональные галлюцинации
- +микropsия

#Основные симптомы обсессивного синдрома:

- +навязчивые мысли (действия)
- +навязчивый счёт
- нарушения памяти
- появление галлюцинаций

#Для депрессивного синдрома характерно

- +замедление мыслительной деятельности
- задержка психического развития
- +замедление движений
- Нарушения памяти

#Для синдрома Кандинского Клерамбо характерно:

- +бред воздействия
- +псевдогаллюцинации
- псевдоременисценции
- каталепсия

#Навязчивые сомнения характеризуется всем перечисленным:

- +сознания их болезненности, критическим отношением к ним
- возникает в результате нарушения памяти
- успокоение больного однократной проверкой
- +сомнение в правильности и точности исполнения

### Трехответные 170 штук

# Истинные галлюцинации характеризуются:

- + усилением в вечернее время
- ощущением угрозы физическому существованию больного
- чувством «сделанности»
- зависеть от времени суток
- + экстрапроекцией
- + четкостью и естественной яркостью образов

# Галлюцинации возникают при:

- + шизофрении
- неврозе
- + эпилепсии
- + алкогольных психозах
- депрессии
- МДП

#Проявлениями обсессивно-фобического синдрома могут быть

- идеи воздействия
- симптом открытости

- + клаустрофобия
- + ритуалы
- + боязнь загрязнения
- алкогольных психозах

#Укажите нарушения ассоциативного процесса по темпу:

- + тахифрения
- + «скачка идей»
- обстоятельность
- +брадифрения
- резонерство
- гипомнезия

#Расстройства мышления при депрессии характеризуются:

- + бредом Котара
- + идеями виновности
- навязчивыми идеями
- причудливыми ассоциациями
- + суицидальными мыслями
- персеверация

#Синдром Кандинского–Клерамбо характеризуется:

- + бредом воздействия
- персеверациями
- + псевдогаллюцинациями
- резонерством
- + симптомом открытости мыслей
- аутизм

#При синдроме Котара обычно наблюдается

- +пониженный фон настроения
- +мегаломанический характер бреда
- психический автоматизм
- бред малого масштаба
- симптомом открытости мыслей
- +преобладание ипохондрических идей

#Расстройства памяти бывают в виде:

- сделанных воспоминаний
- резонерство
- + амнезии
- + криптомнезий
- + обнубиляции
- персеверация

#Ретроградная амнезия характеризуется:

- + выпадением из памяти событий, непосредственно предшествующих бессознательному состоянию
- потерей способности запоминать текущие события
- прогрессирующим течением
- + невозможностью воспроизвести события, бывшие перед утратой сознания

- + распространением подобного забвения на различный период
- прогрессирует по закону Рибо

#Антероградная амнезия характеризуется:

- + выпадением из памяти событий, непосредственно следовавших за окончанием бессознательного состояния
- + распространением подобного забвения на различный период
- выпадением событий, предшествовавших бессознательному состоянию
- + правильным поведением больных в этот, затем забытый период
- потерей способности запоминать текущие события
- прогрессирующим течением

#Что из перечисленного относится к расстройствам памяти:

- + псевдореминисценций
- + ретроградной амнезии
- ментизма и шперрунга
- + антероградной амнезии
- персеверация
- резонерство

#Виды амнезии:

- + ретроградная
- шперрунг
- рекуррентная
- ментизм
- + антероградная
- + фиксационная

#Какие из заболеваний могут быть причиной корсаковского синдрома

- + отравление угарным газом
- + попытка самоповешения
- грипп
- истерический невроз
- + тяжелый атеросклероз головного мозга
- эпилепсия

#Для больных с имбецильностью характерно следующее

- + ограниченный словарный запас и косноязычная речь
- решают простые арифметические задачи (умножение и деление)
- умело пересказывают тексты
- + возможность выработать простейшие навыки опрятности
- + неловкость, нарушение тонкой координации движений
- не развита речь

#Типичными проявлениями маниакального синдрома являются:

- хаотичные бессмысленные движения
- + повышенная отвлекаемость
- + стремление к общению, альтруизм
- + повышение аппетита, гиперсексуальность
- переоценка своих возможностей, способностей

- зрительные галлюцинации

#К типичным проявлениям депрессивного синдрома относятся следующие расстройства:

- + моторная заторможенность
- + замедленное течение представлений
- снижение уровня сознания, сомноленция
- + суицидальные мысли и тенденции
- идеи персекуторного круга
- колебание АД

#Апатический ступор проявляется:

- неестественными, вычурными позами
- + абсолютной безучастностью
- симптомом «воздушной подушки»
- + обездвиженностью
- + выраженной беспомощностью
- ментизм

#Для маниакального состояния характерно:

- + ускорение мышления
- + повышенное настроение
- стремление к убийствам, насилию
- + двигательное возбуждение
- дисморфомания
- ступор

#Классическая депрессия характеризуется:

- + тоской
- + двигательной заторможенностью
- атаксией
- + замедлением мышления
- речевой «окрошкой»
- запором

#Чем из перечисленного проявляется кататонический ступор:

- выраженным депрессивным аффектом
- + обездвиженностью, застывшим амимичным лицом
- + повышением мышечного тонуса
- + длительным сохранением одной позы
- дисмегалопсией
- сумеречным помрачением сознания

#Кататонический ступор проявляется симптомами:

- + «восковой гибкости»
- персеверацией
- + мышечного оцепенения
- + негативизма
- параличей, парезов
- повышением АД

#Что из перечисленного является вариантом кататонического возбуждения:

- ажитированное

- + растерянно-патетическое
- + импульсивное
- + немое
- аутистический
- невротический

#Какие симптомы характерны для кататонического синдрома:

- + каталепсия
- слабодушие
- + мутизм
- тахифренией
- фотопсией
- + эхोलалия и эхопраксия

#Характерными признаками кататонического возбуждения являются следующие симптомы:

- + стереотипные бессмысленные движения
- + вербигерации и эхо-симптомы
- патологическое снижение настроения
- + пассивный и активный негативизм
- ускорение ассоциативного процесса
- импульсивные действия

#Для аментивного синдрома характерно:

- + нецеленаправленность действий
- + бессвязное мышление
- бред инсценировки
- бред воздействия
- бред величия
- + нарушение ориентировки

#Для сумеречного помрачения сознания характерно:

- + зрительные галлюцинации
- бред реформаторства
- мутизм
- + автоматизированные действия
- + дезориентировка
- каталепсия

#Аменция может развиваться

- + при тяжелой инфекции
- при неправильном питании
- при атеросклерозе сосудов головного мозга
- + при ожоговой болезни
- + после осложненных родов
- при ЧМТ

#К формам помрачения сознания относится:

- + онейроид
- галлюцинация
- ступор
- деменция

- + делирий
- + кома

#Что из перечисленного является критерием нарушенного сознания:

- + амнезия периода нарушенного сознания
- + нарушение ориентировки
- галлюцинации
- иллюзии
- зрительные галлюцинации
- + бессвязное мышление

#Для делирия характерно:

- + психомоторное возбуждение
- псевдогаллюцинации
- + дезориентировки во времени
- + тревога
- + амнезия
- персеверация
- каталепсия
- эхолалия

#Какие расстройства сна наиболее характерны для депрессии?

- + поверхностный сон с частыми пробуждениями
- + затрудненное засыпание
- хороший сон
- сверхценные идеи
- + ранние пробуждения
- отсутствие чувства сна

#Соматовегетативные нарушения при депрессии могут быть представлены:

- диареей
- + абдоминальными болями
- лихорадкой с высокой температурой
- + похуданием
- + расстройством менструального цикла
- колебанием АД

#Факультативными признаками депрессивного синдрома являются:

- + гипестезия
- + гневливость
- агарофобия
- мутизм
- + сверхценные идеи ипохондрического содержания
- параноидный синдром

#Боль может быть соматизированным расстройством в клинике:

- + депрессии
- болезни Альцгеймера
- болезни Пика
- Синдром Дауна
- + тревоги
- + шизофрении

#Наиболее типичным расстройством сна при депрессии является:

- + сонливость днем
- + ранние пробуждения
- хороший сон
- незатрудненное засыпание
- боль в конечностях
- + затруднения засыпания из-за наплывов мыслей и образов

#При маскированной депрессии возможна следующая локализация болей:

- + голова
  - + зубы
  - ноги
  - половые органы
  - + живот
  - подреберье
- 

#В психоорганический синдром входит:

- ослабление понимания
- психосенсорные нарушения
- галлюцинации и бред
- +расстройство памяти
- +умственное бессилие
- +недержание аффекта

#При ипохондрическом бреде больной считает, что:

- +у него тяжелая болезнь
- +у него неизлечимая или постыдная болезнь
- он преступник
- его хотят отравить
- его хотят расстрелять
- +никто не может понять его болезнь

#Показанием для госпитализации в психиатрический стационар является:

- маниакальное состояние без склонности к агрессии
- +антиобщественное поведение психического больного
- невроты
- врожденное слабоумие
- +суицидальные мысли и поступки
- +агрессия к окружающим

#Деменция – это:

- легкая степень слабоумия
- тоскливое, угнетенное состояние
- +слабоумие, приобретенное в результате болезни
- врожденное слабоумие
- +старческое слабоумие

+распад хорошо развитого прежде интеллекта

#Укажите клинические свойства истинных галлюцинаций:

- схожесть с реальными образами
- особый характер сделанности, насильственности
- +проецируется в сфере анализаторов чувств, вне тела вокруг больного
- +поведение соответствует содержанию галлюцинаторных образов
- +убежденность в том, что галлюцинаторные образы воспринимаются и окружающими
- чаще при эндогенных психозах

#Укажите клинические свойства псевдогаллюцинаций:

- схожесть с реальными образами
- +особый характер сделанности, насильственности
- проецируется в сфере анализаторов чувств, вне тела вокруг больного
- поведение соответствует содержанию галлюцинаторных образов
- +проецируется в сферы анализаторов чувств: внутри тела или за оптическим горизонтом
- +чаще при эндогенных психозах

#Выберите нарушения относящиеся к психосенсорным расстройствам:

- макропсии
- сенестопатии
- метоморфопсия
- +микропсия
- парестезия
- +дереализация
- +деперсонализация

#Выберите нарушения относящиеся к расстройствам сенсорного синтеза:

- макропсии
- амнезия
- параноид
- +дереализация
- +деперсонализация
- +метоморфопсия

#Выберите синдромы, в которых имеются расстройства сознания:

- кома
- +истерический
- +астенический
- онейроид
- ипохондрический
- +сумеречное расстройство сознания
- апатико-абулический
- +амения

#Выберите расстройство мышления, наиболее свойственное для шизофрении:

- патологическая обстоятельность
- +резонерство
- +символизм
- +аутизм
- вязкость
- тугоподвижность

#Для нарушения мышления не характерно:

- шперрунг
- персеверация
- +криптомнезия
- +каталепсия
- резонерство
- +конфабуляции

#Для алкогольного делирия характерно:

- + зрительные галлюцинации
- фиксационная амнезия
- +психомоторное возбуждение
- парейдолии
- навязчивые идеи
- +дезориентировка в месте и времени

#Следующие симптомы принято называть негативными:

- бредовые идеи
- +апатия-абулия
- навязчивые идеи
- +эмоциональное оскудение
- галлюцинации
- +снижение памяти

#Психический статус пациента определяется исследованием следующего:

- анамнеза
- +настроения
- +памяти
- +мышления
- наследственности
- все ответы верные

#В состав Корсаковского синдрома входят такие компоненты, как:

- дезориентировка во времени и месте
- +фиксационная амнезия
- полиневрит
- +антероретроградная амнезия
- +конфабуляции
- наличие хронического алкоголизма в анамнезе

#Виды кататонического ступора:

- истерический ступор
- +ступор с восковидной гибкостью

- +негативистический ступор
- реактивный ступор
- +субступор
- реактивный ступор

#К симптомам кататонического ступора относится:

- +мышечный гипертонус
- +мутизм
- +Негативизм
- эхо-симптомы
- гипертимия
- гипермнезия

#К признакам помрачения сознания по Ясперсу относится:

- фрагментарность восприятия
- +нарушение мышления
- +дезориентировка во времени, месте
- +полная или частичная амнезия
- резонерство
- гипермнезия

#Для делирия характерны:

- дезориентировка в месте, времени
- +истинные, зрительные, сценopodobные галлюцинации
- +чувственный образный бред преследования
- апатия.
- +психомоторный ступор

#Для делирия ведущими симптомами являются:

- +аффект страха
- резонерство
- +истинные галлюцинации
- фантастические псевдогаллюцинации
- мания
- +дезориентировка в месте, во времени

#Для делирия в отличие от онейроида свойственно:

- +поведение соответствующее содержанию галлюцинаций
- фантастическое содержание галлюцинаций
- продолжительность более 10 дней
- +психомоторное возбуждение
- полная амнезия на реальные события
- +ориентировка в собственной личности

#Делириозное нарушение сознания бывает при заболевании:

- шизофрении
- инфекции
- +черепно-мозговой травме
- +алкоголизме
- инволюционной меланхолии
- +Инттоксикации

#Критериями синдромального диагноза «острый параноид» являются:

- сенестопатии
- +галлюцинации
- наличие иллюзий
- +бред и аффективная насыщенность
- обязательное присутствие бреда воздействия
- +несистематизированный бред

#Клиника социальных фобий

- +страх появления замешательства в присутствии окружающих
- страх смерти
- навязчивые идеи
- сверхценные идеи
- +страх публичных выступлений в присутствии окружающих
- страх заражения венерической болезнью

#К обсессиям относятся:

- +навязчивый счёт
- амнезия
- криптомнезии
- псевдогаллюцинации
- +навязчивые действия
- +навязчивые репродукции

#Для истерического невроза характерно:

- ипохондрический бред
- +расстройства чувствительной сферы
- +расстройства двигательной сферы
- +расстройства вегетативной нервной системы
- чаще встречается у мужчин
- чаще встречается у шизоидных типов личностей

#Психопатия является:

- +расстройством личности
- +дисгармоничность психического склада
- расстройством мышления
- расстройством интеллекта
- +аномалия характера
- расстройством вследствие алкогольной интоксикации

#К расстройствам сна относится:

- ночное недержание мочи
- кошмарные сновидения
- +трудности засыпания
- онейроид
- +раннее пробуждение
- +поверхностный, тревожный сон

#Для 2 стадии хронического алкоголизма характерно:

- +физическая зависимость
- +психическая зависимость
- гипермнезия

- симптом Липмана
- судорожный синдром
- +запойный характер пьянства

#Для алкогольного делирия характерно:

- +микро-зоопсии черно-белого цвета в ночное время
- яркие галлюцинации религиозного содержания
- полная амнезия пережитого
- +на фоне алкогольной абстиненции
- +аффект страха
- вербальный галлюциноз приятного содержания

#Для психоза Корсакова характерно:

- +полиневропатии
- расстройства восприятия со снижением интеллекта
- расстройства мышления с артралгией
- +фиксационная амнезия
- расстройства полового влечения с деменцией
- +конфабуляции, псевдореминисценции

#Формы шизофрении:

- интоксикационная
- +простая
- +Кататоническая
- инфекционная
- +гебефреническая
- амнестическая

#Кататонический синдром в своей структуре имеет все симптомы:

- прогрессирующая амнезия
- деменция
- +симптом капюшона
- +каталепсия
- симптом Липмана
- +эмбриональная поза

#Тактика при кататоническом ступоре в себя включает:

- фиксация больного
- +мажептил
- аминазин
- +профилактика пролежней
- ноотропил
- +парентеральное питание

#Шизофренический дефект проявляется в виде симптомов:

- снижение интеллекта по органическому типу
- маниакальное состояние
- +абулия
- Корсаковского синдрома
- +аутизм
- +апатия

#Для инволюционного параноида характерен бред:

- +ущерба
- реформаторства
- изобретательства
- +отношения
- преследования
- +типохондрический

#Для болезни Альцгеймера характерны:

- +расстройства памяти
- расстройства сознания
- +прогрессирующее течение
- расстройства восприятия
- расстройства мышления
- +расстройства интеллекта

#Для болезни Пика характерно:

- слуховые галлюцинации
- +развитие в течение 1 года
- +личностные изменения
- нарушение социального поведения
- +афазия
- психические автоматизмы

#Симптомы при болезни Гентингтона характеризуют :

- резонёрство
- +замедление мышления
- +непроизвольные хореоформные движения
- маниакальные состояния
- +замедление моторики
- Корсаковский симптом

#Для сосудистой деменции характерно:

- +сохранность ядра личности
- тотальный характер
- амбивалентность
- распад ядра личности
- +критика к своему состоянию сохранена
- +лакунарный характер

#В остром периоде инфаркта миокарда может наблюдаться:

- гебефрения
- +оглушенность
- +тревога
- +фобия
- псевдореминесценции
- каталепсия

#Для гипертонической болезни характерно:

- тотальная деменция
- маниакальные состояния
- +психопатоподобный синдром

- +нарушения сна
- мутизм
- +неврозоподобный синдром

#Психотические расстройства сознания

- обнубиляции
- делирий
- абсансы
- нарколепсия
- +сумеречное помрачение сознания
- сопор
- +онейроид
- +амения

#Для шизофрении характерны следующие симптомы

- подозрительность
- конфабуляции
- +нарушение сна
- амбулаторные автоматизмы
- +бредовые идеи
- +апатия

#Какой из симптомов характерен для невроза навязчивых состояний?

- галлюцинации
- гиперестезия
- +обсессии
- бредовые идеи
- +фобии
- +ритуалы

#Психическая анорексия встречается:

- при деменции
- +при депрессиях
- +при кататонических состояниях
- при олигофрении
- +при бреде отравления
- при маниакальном синдроме

#Для какого типа шизофрении наиболее характерно наличие ремиссии:

- непрерывный злокачественный
- вялотекущий
- +непрерывный малопрогрессирующий
- приступообразно-прогрессирующий
- +периодический рекуррентный
- +шубообразный

#Отказ от еды наблюдается при:

- +нервной анорексии
- +депрессивном синдроме
- +кататоническом ступоре
- маниакальном синдроме
- +бреде отравления

-псевдодеменции

#В структуре синдрома Кандинского-Клерамбо различают

+бред воздействия

-пуэрилизм

+идеаторный автоматизм

-амбулаторный автоматизм

+кинестетический автоматизм

-псевдогаллюцинации

+псевдодеменция

-псевдореминесценции

#Все перечисленные ниже верно характеризуют шизофрению

+возникает вследствие наследственной предрасположенности

-течение хроническое безремиссионное

+проявления характеризуются полиморфизмом

+нарушается единство психических процессов

+исход апатико-абулический синдром

-осложняется грубыми нарушениями памяти

#При всех следующих состояниях возможно возникновение социально опасных и суицидальных форм поведения

-деменция

+императивные галлюцинации

+классическая (заторможенная) депрессия

-слабодушие

+ажитированная депрессия

-апатико-абулическое состояние

+приступ дисфории

-навязчивые состояния

#Для алкоголизма характерно:

+развитие изменений личности

+прогредиентность течения заболевания

+наличие абстинентного синдрома

-отсутствие соматических расстройств

+синдром токсической энцефалопатии

-непрогредиентное течение

-кататонический синдром

-полное выздоровление

#Алкоголизм характеризуется:

-непрогредиентным течением

+патологическим влечением к алкоголю

+возникновением абстинентного синдрома

+соматическими расстройствами

-псевдогаллюцинациями

-амбулаторными автоматизмами

#Речь больного состоящая из обрывков фраз и отдельных слов или слогов свидетельствует о:

- +инкогеренции мышления
- резонерстве мышления
- паралогичности мышления
- +бессвязности мышления
- персеверации мышления
- +шизофазии

#В клинику инволюционной меланхолии входят:

- +тревожное возбуждение
- +подавленное настроение
- псевдореминисценции
- +бред осуждения
- синдром Кандинского-Клерамбо
- деменция

#Для II стадии алкоголизма характерны следующие расстройства:

- +абстинентный синдром
- +острые алкогольные психозы
- алкогольные палимпсесты
- +повышение толерантности
- полиневрит
- судорожный синдром

#Встречается при II стадии алкоголизма

- +похмельный абстинентный синдром
- снижение толерантности к алкоголю
- деградация личности
- +психопатизация личности
- алкогольная деменция
- +повышение толерантности

#Нарушение мышления, свойственное эпилепсии:

- резонерство
- +патологическая обстоятельность
- паралогическое
- +вязкость мышления
- разорванное
- вербигерация

#К критериям бреда относится:

- +патологическое содержание идей
- реальная основа их возникновения
- навязчивый характер идей
- поддается коррекции
- +недоступность коррекции
- +убеждение в правильности идей

#Показаниями к неотложной госпитализации психических больных являются:

- +наличие у больного тенденции к самоубийству
- редкие эпилептические припадки.
- +агрессия к окружающим
- эпилептический статус

- +императивные галлюцинации
- астенический синдром

#Для неврастении характерны следующие симптомы:

- раздражительная слабость
- +стягивающие головные боли
- астазия-абазия
- +рассеянность, неустойчивость настроения
- +вегетативные расстройства
- стойкие obsессии

#Вид бреда, относящийся к первичному:

- +бред изобретательства
- +бред преследования
- бред могущества, величия
- бред самообвинения
- +бред воздействия
- бред высокого происхождения

#Для бредовых идей характерно:

- +ложное умозаключение
- наличие реального объекта
- навязчивый характер идей
- +невозможность коррекции
- критическое отношение
- +непоколебимая убежденность

#Первичный бред в отличие от вторичного характеризуется:

- непоколебимостью убеждения
- +монотематичностью
- отсутствие критики
- невозможностью коррекции
- +системой доказательств
- +Системой защиты

#Для истерического припадка характерны следующие расстройства:

- кома
- стереотипное повторение фаз приступа
- +сохранение чувствительности
- +длительность до нескольких часов
- отсутствие реакции зрачков на свет
- +сохранение реакции зрачков на свет

#К навязчивостям относятся:

- +клаустрофобия
- гебефрения
- +кардиофобия
- дисморфомания
- ипохондрический бред
- +канцерофобия

#Какие клинические признаки характерны для имбецильности?

- +косноязычность
- +словарный запас достигает 200-300 слов
- трудовые навыки
- +навыки самообслуживания
- адаптируемость к внешним условиям
- обучаемость к работе

#К реактивным психозам относятся:

- пуэрилизм
- +депрессивный синдром
- +псевдодеменция
- синдром Кандинского-Клерамбо
- инволюционный параноид
- +синдром Ганзера

#Вторичный бред характеризуется:

- систематизированностью
- +образностью
- +динамичностью
- интерпретативностью
- +не систематизированностью
- системой защиты и доказательств.

#Суицидальные мысли и попытки характерны для:

- +дисморфомании
- +депрессии
- комментирующих галлюцинаций
- +типохондрического бреда
- бреда реформаторства
- императивных галлюцинаций

#Бред чаще встречается при:

- эпилепсии
- маниакально-депрессивном психозе
- алкоголизме
- +реактивных состояниях
- +параноидной шизофрении
- +алкогольных психозах

#Для паранойяльного бреда характерно:

- +стройная система доказательств
- вторичность возникновения
- +невозможность логической коррекции
- сочетание с галлюцинациями
- +поиск новых подтверждений своей правоты
- политематичность и изменчивость в динамике

#Какие симптомы характерны для алкогольного абстинентного синдрома?

- возникает через 2 месяца после начала злоупотребления алкоголем.
- +гиперемия лица, тахикардия
- +сухость во рту, понижение аппетита
- +кошмарные сновидения

- конфабуляции
- резкое сужение зрачка

#Перечислите симптомы, характерные для триады Протопопова?

- + тахикардия
- дермографизм.
- +запоры
- +расширение зрачков
- тремор рук
- гиперсаливация

#Для обсессивного синдрома характерно:

- +снижение настроения
- +повышение тревожности
- +навязчивости различного вида
- отсутствие критичности
- реальная основа для возникновения
- неподдаваемость коррекции

#К обсессиям относится:

- +контрастные желания
- дипсомания
- сверхценные идеи
- +ритуалы
- ментизмы
- +фобии

#Сенестопатии характеризуются:

- +неприятными ощущениями
- гиперестезией.
- +чувством стягивания
- +чувством переливания
- ложным узнаванием
- четкой локализацией

#К разновидностям ипохондрического бреда относится.

- +нигилистический
- +дисморфоманический
- преследования
- воздействия
- +синдром Котара
- ревности

#Навязчивые расстройства встречаются при.

- олигофрении в степени имбецильности
- +неврозе навязчивых состояний
- +фобическом неврозе
- +неврозоподобной шизофрении
- психопатии
- тотальной деменции

#Для шизофрении характерно:

- +паралогичность мышления
- +резонерство
- +снижение энергетического потенциала
- интеллектуально-мнестическое снижение
- отсутствие прогрессивности
- фиксационная амнезия

#К патологии мышления относится:

- конкретно-образное мышление
- +замедление мышления
- средний темп мышления
- +резонерство
- +разорванность
- Абстрактное мышление

#Патологии мышления по содержанию относятся:

- ментизм
- +бред преследования
- +навязчивые мысли
- +сверхценные идеи
- шперрунг
- резонерство

#В синдром психического автоматизма входит:

- конфабуляции
- трансы
- +сенестопатический автоматизм
- амбулаторный автоматизм
- +моторный автоматизм
- +ассоциативный автоматизм

#Ментизм - это

- вихрь идей
- +увеличение количества ассоциаций
- уменьшение количества ассоциаций
- +непроизвольно возникающий наплыв воспоминаний
- +наплыв образов, представлений
- разновидность нарушения влечений

#Для паранойяльного синдрома характерно:

- +наличие первичного бреда
- +бредовая интерпретация окружающей действительности
- галлюцинации
- вторичность возникновения
- психические автоматизмы
- +систематизированный монотематический бред

#Бред преследования характерен для:

- +инволюционного параноида
- неврастении
- астенической психопатии
- +параноидной шизофрении

-маниакально-депрессивного психоза  
+белой горячки

#Социальную опасность представляют больные с:

+тоскливой депрессией  
-астеническим синдромом  
+бредом ревности  
+декомпенсацией возбудимой психопатии  
+обсессивным синдромом  
-императивными галлюцинациями  
-деменцией  
-астазией – абазией

#Для вялотекущей шизофрении характерны:

-галлюцинаторно-параноидные расстройства  
-кататоническая симптоматика  
-дефект личности  
+неврозоподобные расстройства  
+деперсонализационные расстройства  
+изменение личности по шизоидному типу

#В виды навязчивых страхов входит:

-страх во время делирия  
+страх смерти  
-страх бреда  
-страх галлюцинаций  
+страх заражения  
+страх острых предметов

#Навязчивые расстройства встречаются при:

+неврозоподобной шизофрении  
-деменции  
+неврастенической стадии гипертонической болезни  
+психастеническом неврозе  
-маниакальной фазе МДП  
-олигофрении

#При диагностике психопатий учитывают следующие критерии:

-колебание настроения  
+тотальность характерологических нарушений  
-заострение отдельных черт характера  
+относительная стабильность  
+выраженность патологических черт личности до нарушения социальной адаптации  
-транзиторность психопатологических нарушений

#К приступообразным психическим расстройствам при эпилепсии относятся:

+припадки  
-слащавость  
-злопамятность  
+дисфории  
+сумеречное помрачение сознания

-обстоятельность

#К психическим эквивалентам при эпилепсии относятся:

- +дисфории
- малые припадки
- эпилептический статус
- +пароксизмальные страхи
- +амбулаторный автоматизм
- большие припадки

#К нарушению мышления по стройности /структуре/ относится:

- +вербигерация
- +разорванность
- паралогизмы
- +бессвязность
- резонерство
- бредовые идеи

#К нарушениям мышления по темпу относится:

- обстоятельность
- символизм
- +ускорение
- +замедление
- +шперрунг
- психические автоматизмы

#Основными клиническими признаками алкогольного опьянения служат:

- +запах алкоголя изо рта
- +количество алкоголя в крови
- +особенности речи, моторики
- +вегетососудистые симптомы
- биохимические методы
- электроэнцефалография

#Заболевание, при котором чаще наблюдаются навязчивые идеи

- болезнь Альцгеймера
- +психастенический невроз
- Маниакально-депрессивный психоз
- +декомпенсация психопатии психастенического круга
- Корсаковский психоз
- +Неврозоподобная шизофрения

#Для бреда свойственно:

- +отсутствие критики
- снижение памяти
- +невозможность логической коррекции
- легко поддается коррекции
- конфабуляции
- +непоколебимое убеждение

#К патологии мышления по структуре относится:

- +резонерство
- +аутичность
- шперрунг
- +обстоятельность
- ментизм
- замедление мышления

#Для ускорения мышления характерно:

- непроизвольный наплыв мыслей
- +отвлекаемость внимания
- +увеличение числа ассоциаций
- низкая продуктивность
- +ускорение темпа образов, мыслей
- чувство «сделанности»

#К бреду относится:

- +ложное, ошибочное суждение
- +суждение не поддающиеся разубеждению
- +суждение противоречащее реальной действительности
- навязчивое суждение
- суждение охватывающее сознание больного
- суждение на основе реальной действительности

#Образные навязчивости:

- +агорафобия.
- +клаустрофобия.
- навязчивый счет
- навязчивые репродукции
- аритмомания
- +нозофобия

#Патология, характерная для синдрома Кандинского-Клерамбо:

- +бред воздействия
- бред могущества
- амбулаторные автоматизмы
- +психические автоматизмы
- стереотипия
- +псевдогаллюцинации

#Расстройства мышления по темпу:

- +замедленность
- +шперрунг
- бессвязность
- резонерство
- обстоятельность
- +тахифрения

#К нарушениям мыслительного процесса относится:

- +резонерство

- +неологизм
- амбивалентность
- +навязчивые мысли
- абулия
- апатия

#К парамнезиям относятся:

- +криптамнезии
- гипомнезии
- +конфабуляции
- амнезии
- +псевдореминисценции
- гипермнезии

#Навязчивости могут наблюдаться при:

- +психастенической психопатии
- реактивном психозе
- +неврозе
- травматическом психозе
- инфекционном психозе
- +Неврозоподобная шизофрения

#В структуру Корсаковского синдрома входят:

- +фиксационная амнезия
- непоследовательность мышления
- +конфабуляции и псевдореминисценции
- +ретро и антероградная амнезия
- прогрессирующая амнезия
- патологическая обстоятельность

#Для синдрома Кандинского-Клерамбо свойственно.

- +наличие псевдогаллюцинаций
- +бред психического и физического воздействия
- иллюзорное восприятие мира
- инкогеренция мышления
- +психические автоматизмы
- наличие истинных галлюцинаций

#Бредовые идеи встречаются при:

- +шизофрении
- неврастении
- +алкогольном параноиде
- психастеническом неврозе
- церебральном атеросклерозе 1 ст
- +реактивном психозе

#Для больных с дебильностью характерно

- +IQ от 50 до 70
- +способность к обучению
- плохая механическая память
- неспособность к труду

+относительная сохранность навыков самообслуживания

#Характерными клиническими проявлениями олигофрений являются

+слабость абстрактного мышления

-патология восприятия

+слабость целенаправленного внимания

+недостаточная память как при воспроизведении, так и при запоминании

-патология воли

-слабость конкретного мышления

#Олигофреническое слабоумие возникает

+Во время внутриутробного развития

-в детском возрасте

+вследствие генетических дефектов и средовых вредностей

+в раннем возрасте (до 3 лет)

-в период зрелости

-независимо от возраста

#Сенестопатии характеризуются:

+неприятными ощущениями

-гиперестезией.

+чувством стягивания

+чувством переливания

-ложным узнаванием

-четкой локализацией

#Для психопатий характерно

+стойкие аномалии личности

+дисгармония эмоционально-волевой сферы

-приступы агрессии

+преобладание своеобразного, преимущественно аффективного мышления

-криминальная деятельность

-импульсивность и раздражительность

#Астенический синдром как последствие черепно-мозговой травмы характеризуется всем перечисленным, кроме

-проявлений раздражительной слабости

-аффективной лабильности

+галлюцинаций

+нарушением сознания

-головных болей и вегетативных нарушений

+слабоумия

#Классическая депрессивная триада характеризуется

+эмоциональным торможением

+двигательным торможением

-кататоническими расстройствами

+идеаторным торможением

-торможением развития

-идеями самообвинения

#Маниакальная триада характеризуется

- +повышенным настроением
- +ускорением ассоциаций
- +двигательным возбуждением
- повышением либидо
- замедлением ассоциаций
- нарушением памяти

#Ипохондрический синдром проявляется всем перечисленным, исключая

- чрезмерно утрированное внимание к здоровью
- +психические автоматизмы
- убежденность в существующем заболевании
- +бред отравления
- подавленное настроение с сеностопатиями и мыслями о неизлечимой болезни
- бредовую убежденность в существовании несуществующей болезни
- +действительное наличие соматической болезни

#Истерический припадок проявляется всем перечисленным, кроме

- +припадка с клонической и тонической фазой
- разнообразных сложных, выразительных движений
- +соматогенной обусловленности
- +судорожной активности на ЭЭГ
- психогенной обусловленности
- усиления и затягивания при скоплении людей вокруг

#Для галлюцинаций характерно

- +восприятие несуществующего
- возникновение несуществующего из реального объекта
- +наличие произвольно возникающих представлений, проецируемых вовне
- +характер проекции, неотличимой от реальных объектов
- наличие произвольно возникающих представлений, проецируемых внутрь
- только одной модальности

#Истинным галлюцинациям свойственно

- +произвольное возникновение представлений
- произвольное вызывание представлений
- +проецирование их вовне
- +яркость, неотличимость от реальных предметов
- блеклость галлюцинаций
- проецирование во внутрь

#Кататонический ступор проявляется всем перечисленным, кроме

- обездвиженности застывшего амимичного лица
- +выраженного депрессивного аффекта
- +понижения мышечного тонуса
- длительно сохранения одной позы
- отказа от речи, негативизма
- +повышением сухожильных рефлексов

#Депрессивное возбуждение проявляется всем перечисленным, кроме

- двигательного возбуждения
- +того, что больные сидят неподвижно
- +апатии, безразличия

- мучительной, невыносимой тоски
- того, что больные стонут, рыдают, пытаются нанести себе повреждения
- +ощущения сделанности состояния

#Тревожное возбуждение проявляется

- +общим двигательным беспокойством
- общим двигательным оцепенением
- +тревогой, страхом
- +различной выраженностью ажитации
- агрессией к окружающим
- сумеречным расстройством сознания

#Гебефреническое возбуждение проявляется всем перечисленным, кроме

- дурашливости, гримасничания
- +преобладания выражения восторга, экстаза
- нелепого, бессмысленного хохота
- +депрессивного расстройства
- неуместных плоских шуток
- +критичности к своему состоянию

#Онейроидная кататония проявляется

- +фантастическими галлюцинаторными расстройствами
- +ступором с явлениями восковой гибкости, ступорозными состояниями
- +онейроидным помрачением сознания
- отсутствием помрачения сознания
- кататоническим возбуждением

#Делирий характеризуется всем перечисленным, кроме

- +кататонических включений
- помрачения сознания
- +дезориентировки в собственной личности
- наплыва парейдолий и сценopodobных зрительных галлюцинаций
- резко выраженных двигательных возбуждений
- +ориентировки в окружающем

#Оглушение проявляется всем перечисленным, кроме

- понижения вплоть до полного исчезновения ясности сознания
- +выраженных галлюцинаторных расстройств
- +выраженных бредовых включений
- повышения порога возбудимости для всех внешних раздражителей
- замедленности мышления, трудности в осмыслении ситуации в целом
- +спонтанности, подвижности

#Обнубиляция проявляется

- +замедленностью реакций, в первую очередь, речевых
- ускоренностью речевых реакций
- + "облачности сознания", "вуали на сознании"
- часто мрачностью настроения
- +продолжительностью от минут до длительного времени
- продолжительностью не более минуты

#В психоорганический синдром входит:

- ослабление понимания
- психосенсорные нарушения
- галлюцинации и бред
- +расстройство памяти
- +умственное бессилие
- +недержание аффекта

#При ипохондрическом бреде больной считает, что:

- +у него тяжелая болезнь
- +у него неизлечимая или постыдная болезнь
- он преступник
- его хотят отравить
- его хотят расстрелять
- +никто не может понять его болезнь

#Показанием для госпитализации в психиатрический стационар является:

- маниакальное состояние без склонности к агрессии
- +антиобщественное поведение психического больного
- неврозы
- врожденное слабоумие
- +суицидальные мысли и поступки
- +агрессия к окружающим

#Деменция – это:

- легкая степень слабоумия
- тоскливое, угнетенное состояние
- +слабоумие, приобретенное в результате болезни
- врожденное слабоумие
- +старческое слабоумие
- +распад хорошо развитого прежде интеллекта